

ANNEXES

à l'enquête de la Fondation contre le Cancer sur le comportement des fumeurs - 2009

1. Méthodologie

- Sept enquêtes effectuées par Ipsos à la demande du CRIOC (2002), du VIG (2003) et de la Fondation contre le Cancer (2005, 2006, 2007, 2008, 2009), sur base de la même méthodologie, auprès de 2 000 personnes en 2002, 2003 et 2005 ; et auprès de 4 000 personnes en 2006, 2007, 2008 et 2009.
- La marge d'erreur pour l'échantillon de 4 000 personnes est de 1,3%. Il existe une différence significative dans le pourcentage de fumeurs quotidiens entre 2007 et 2008, et entre 2008 et 2009.
- 3 806 personnes de 15 ans et plus ont été interrogées 'face to face' à leur domicile du 4 septembre au 11 décembre 2009.
- L'échantillon a été stratifié en fonction des provinces et du type d'urbanisation. Le croisement de ces deux variables donne 37 cellules. Dans chacune de ces cellules, un point de départ a été sélectionné au hasard et s'est vu attribuer un certain nombre d'interviews, proportionnellement à la population de cette cellule. Le nombre de points de départ est estimé à cent.
- Des quotas ont été appliqués en ce qui concerne le sexe, l'âge, la profession (actif, inactif) et le niveau d'étude des personnes interrogées.
- La détermination des groupes sociaux s'appuie sur un ratio calculé d'après la profession du principal responsable des revenus du ménage et son niveau de formation. La population est classée en fonction de la valeur résultant de la combinaison de ces deux variables, puis répartie en huit groupes plus ou moins égaux. Le groupe qui correspond aux valeurs les plus élevées (et par conséquent au niveau professionnel et/ou de formation le plus élevé) est désigné comme le groupe 1, tandis que le groupe 8 concorde avec les valeurs les plus faibles.
- La population totale concernait 8 600 000 personnes de quinze ans et plus vivant en Belgique.

2. Le pourcentage de fumeurs augmente pour la première fois depuis 2002

D'après une enquête réalisée auprès de 3 806 personnes de plus de 15 ans (effectuée entre le 4 septembre et le 11 décembre 2009 par Ipsos pour la Fondation contre le Cancer et financée par le fonds 'tabac'), le pourcentage de fumeurs quotidiens en Belgique est de 32%. C'est la deuxième fois en 7 ans que le pourcentage de fumeurs quotidiens augmente de manière significative : 29% en 2002, 28% en 2003, 29% en 2005 et 2006, 27% en 2007, 30% en 2008 et 32% et 2009.¹

Tableau 1

| Pourcentage de fumeurs quotidiens en Belgique (15 ans et plus) | | | |
|---|--------|--------|-------|
| année | hommes | femmes | total |
| 2002 | 33% | 25% | 29% |
| 2003 | 32% | 22% | 28% |
| 2005 | 35% | 24% | 29% |
| 2006 | 33% | 25% | 29% |
| 2007 | 31% | 24% | 27% |
| 2008 | 34% | 26% | 30% |
| 2009 | 37% | 27% | 32% |

Source: CRIOC (2002), VIG (2003), Fondation contre le Cancer (2005-2006-2007-2009)

En 2009, notre pays comptait environ 4 040 000 personnes n'ayant jamais fumé, 3 010 000 fumeurs et 1 550 000 anciens fumeurs. Pour cette même année, on comptait 32% de fumeurs quotidiens, 3% de fumeurs occasionnels, 18% d'anciens fumeurs et 47 % de personnes n'ayant jamais fumé.

¹ Sept enquêtes effectuées par Ipsos sur base de la même méthodologie, à la demande du CRIOC (2002), du VIG (2003) et de la Fondation contre le Cancer (2005, 2006, 2007, 2008, 2009), sur base de 2 000 personnes en 2002, 2003 et 2005 ; et 4 000 personnes en 2006, 2007, 2008 et 2009.

Les fumeurs fument en moyenne 18 cigarettes par jour (même nombre qu'en 2008). Le pourcentage de fumeurs consommant du tabac à rouler a évolué comme suit : 27% en 2003-2004, 30% en 2006, 25% en 2007, 23% en 2008 et 24% en 2009. Le pourcentage de fumeurs fumant des cigarettes ordinaires s'élevait à 77% en 2003-2004, 65% en 2006, 78% en 2007, 79% en 2008 et 81% en 2009. En 2009, 81% des fumeurs ont fumé des cigarettes ordinaires, 24% du tabac à rouler, 6% des cigares, des cigarillos ou la pipe et 1% la pipe à eau ou shisha. Le total dépasse les 100% car certains fumeurs combinent différents types de consommation.

L'augmentation du nombre de fumeurs n'est pas due au hasard. L'expérience des 30 dernières années nous a montré que, sans nouveaux incitants, le nombre de fumeurs remonte toujours. Le prix d'un paquet de cigarettes a augmenté de 0,50 euro en 2007, ce qui a causé une baisse du pourcentage des fumeurs de 29% à 27%. Ces 3 dernières années, le prix des paquets des marques les plus vendues n'a augmenté que de 0,10 euro par an, et le nombre de fumeurs est passé de 27% à 32%. De plus, la part de marché des cigarettes à bas prix (4 euros ou moins le paquet) a presque atteint les 30%

Tableau 2

| Evolution du prix (en euro) d'un paquet de 20 cigarettes (Marlboro) durant la période 2002 - 2010 | |
|--|-----------------|
| 2002 | 3,20 |
| 2003 | 3,50 |
| 2004 | 3,85 |
| 2005 | 4,00 |
| 2006 | 4,00 |
| 2007 | 4,53* |
| 2008 | 4,63** |
| 2009 | 4,74*** |
| 2010 | 4,84**** |

* €4,30 pour un paquet de 19 cigarettes ** €4,40 pour un paquet de 19 cigarettes

*** €4,50 pour un paquet de 19 cigarettes **** €4,60 pour un paquet de 19 cigarettes

De plus, l'interdiction totale de fumer dans les cafés en Belgique a une fois de plus été mise sur une voie de garage. Pour rappel, 16 pays européens ont un horeca sans fumée à l'heure actuelle (Irlande, Norvège, Italie, Malte, Suède, Ecosse, Lituanie, Islande, Estonie, Angleterre, France, Slovénie, Pays-Bas, Finlande, Turquie et Chypre).

Les ventes de cigarettes ont chuté durant la période 2007-2009, de 7% en Belgique et de 18% au Grand-Duché du Luxembourg. Cette baisse est la conséquence d'un ralentissement des achats par les Britanniques ayant perdu du pouvoir d'achat à cause de la chute de la livre sterling face à l'euro, ce qui entraîne, pour eux, une hausse du prix des paquets en euro.

Les conséquences de la crise économique sur les habitudes de consommation des fumeurs ne sont pas très claires. En Islande, pays européen le plus touché par la crise économique, le pourcentage de fumeurs quotidiens est passé de 19% en 2007 à 15% en 2009. Notre analyse est que la crise économique n'a pas d'influence sur le démarrage de la consommation de tabac et peut compliquer l'arrêt tabagique. En comparaison avec 2007, on constate une augmentation du pourcentage de fumeurs masculins et une stagnation du pourcentage de personnes qui recommencent à fumer ou qui n'arrêtent pas. Le pourcentage de jeunes fumeurs (15 à 24 ans) reste inchangé.

3. Comparaison du nombre de fumeurs quotidiens selon la classe d'âge et le sexe en 2007, 2008 et 2009

L'échantillon de l'enquête effectuée par Ipsos à la demande de la Fondation contre le Cancer est composé d'environ 4 000 personnes de 15 ans et plus. C'est un large échantillon, qui permet une comparaison sur plusieurs années des habitudes de consommation en fonction des classes d'âge et du sexe. En comparaison avec 2007, on constate une augmentation du pourcentage de fumeurs chez les hommes. La reprise de la consommation de tabac augmente également, alors que le nombre d'arrêts baisse. Le pourcentage de jeunes fumeurs (15 à 24 ans) reste inchangé.

Tableau 3

| Fumeurs quotidiens en fonction de l'âge et du sexe entre 2007 et 2009 | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| | 15-24 ans | 25-44 ans | 45-64 ans | 65 ans + | Total |
| Femmes 2007 | 24% | 28% | 28% | 10% | 24% |
| Femmes 2008 | 19% | 36% | 32% | 8% | 26% |
| Femmes 2009 | 19% | 36% | 34% | 9% | 27% |
| Hommes 2007 | 27% | 37% | 35% | 15% | 31% |
| Hommes 2008 | 30% | 44% | 34% | 20% | 34% |
| Hommes 2009 | 30% | 44% | 39% | 25% | 37% |
| Total 2007 | 26% | 33% | 32% | 12% | 27% |
| Total 2008 | 24% | 40% | 33% | 13% | 30% |
| Total 2009 | 26% | 39% | 36% | 16% | 32% |

4. Comparaison du nombre de fumeurs quotidiens en 2007, 2008 et 2009 en fonction de la classe sociale et du sexe

La stratification en classes sociales est réalisée en fonction de l'occupation professionnelle et du niveau d'étude du principal responsable des revenus du ménage. La classe 1-2 est la plus élevée, et la 7-8 la plus basse. Par rapport à 2007, le pourcentage d'hommes fumeurs appartenant à la classe 7-8 est passé de 36% en 2007 à 45% en 2009. Pour les femmes, l'augmentation est répartie sur toutes les classes sociales.

Tableau 4

| Habitudes de consommation chez les hommes en 2007, 2008 et 2009 en fonction de la classe sociale | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Fumeurs quotidiens | Classe sociale 1-2 | Classe sociale 3-4 | Classe sociale 5-6 | Classe sociale 7-8 | Total |
| 2007 | 25% | 31% | 31% | 36% | 31% |
| 2008 | 27% | 34% | 38% | 36% | 34% |
| 2009 | 28% | 36% | 37% | 45% | 37% |

Tableau 5

| Habitudes de consommation chez les femmes en 2007, 2008 et 2009 en fonction de la classe sociale | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Fumeuses quotidiennes | Classe sociale 1-2 | Classe sociale 3-4 | Classe sociale 5-6 | Classe sociale 7-8 | Total |
| 2007 | 19% | 23% | 28% | 23% | 24% |
| 2008 | 19% | 26% | 31% | 31% | 26% |
| 2009 | 22% | 28% | 33% | 27% | 27% |

5. Proportion de fumeurs quotidiens par région

En 2009, on comptait 30% de fumeurs quotidiens en Flandres et 34% à Bruxelles et en Wallonie. En 2008, les chiffres étaient de 29% en Flandres et à Bruxelles et 32% en Wallonie.

6. Résultats concernant la pipe à eau

C'est la première fois que nous posons une question concernant l'usage de la pipe à eau (shisha) : 1% des fumeurs l'utilisent. C'est dans la catégorie d'âge des 15/17 ans qu'elle est le plus utilisée, avec 6% de consommateurs. A la question "Lequel de ces 5 produits du tabac est le moins dangereux pour la santé ?", 56% ont donné la bonne réponse, à savoir "aucun". 14% ont répondu la pipe à eau, 14% le cigare, 6% la cigarette, 6% le cannabis et 4% le tabac à rouler. Une fois de plus, la plupart des jeunes de 15 à 17 ans sous-estiment la dangerosité de la pipe à eau. 30% considère en effet que c'est la manière la moins dangereuse de fumer.