


سکرینینگ یا تشخیص د چا لپاره دي؟

- د هغو خلکو لپاره چې د توبرکلوز (د نري رنځ) اخته کس سره په دې وروستيو کې له نږدې په تماس کې وي.

- د هغو کسانو لپاره چې د نري يا د توبرکلوز مرض اخته کېدو خطر يې د دوی د فعاليتونو له امله پېر وي.



څنگه بايد تدواي شي؟

د انفیکشن په مرحله کې، يا د پټ نري رنځ په مرحله کې:

ډاکټر کولی شي تاسو ته د مخنيوی درملنه درکړي: دا د دې لپاره نه ده چې تاسو ته شفا درکړي، (ځکه چې تاسو په دې مرحله کې ناروغ نه یاست) مګر په راتلونکي کې د نري رنځ یا توبرکلوز د پراختیا خطر کموي. په عموم کې، یو واحد درمل (انټي بیوتيک) هره ورځ د 6 میاشتو لپاره اخیستل کیږي.

که توریکلون ناروغي تایید شوي وي :

په دې حالت کې درملنه خورا اړینه ده، او اوږده ده، تاسو لږ تر لږه 6 میاشتې او هره ورځ د څو درملو (انټي بیوتيکونو) اخیستلو ته اړتیا لرئ. درملنه په نږدې 100٪ قضیو کې ترلاسه کیږي که چېرې درمل په سمه توګه وخورل شي.



زموږ سره اړیکه ونیسئ :

د تنفسي ناروغیو فنډ ASBL

- مرکزي ټیم

Rue Haute 290, Bâtiment 800 1000 Bruxelles
تېلیفون : 025122946 فکس : 025111417
info@fares.be

- په بروکسل کې د نري رنځ (توبرکلوز) د مخنيوي مرکز
تېلیفون : 025115401
cpt.bruxelles@fares.be


- د Hainaut د نري رنځ (توبرکلوز) د مخنيوي مرکز
تېلیفون : 071313504
cpt.hainaut@fares.be

- د Liège د نري رنځ (توبرکلوز) د مخنيوي مرکز
تېلیفون : 042793008
cpt.liege@fares.be

- د Luxembourg د نري رنځ (توبرکلوز) د مخنيوي مرکز
تېلیفون : 084320640
cpt.luxembourg@fares.be

- د Namur او Brabant wallon د نري رنځ (توبرکلوز) د مخنيوي مرکز
تېلیفون : 081775102
cpt.namur-brabantwallon@fares.be

د نري رنځ (توبرکلوز) یو ناپېژانده



د نري رنځ يا توبركلوز څه شی دی ؟

نري رنځ يا توبركلوز يوه ناروغي ده چې د د کوچ بيكيلس (BK) ميكروب له امله رامېنځته كيږي ، دا اكثرا په سږو بريد كوي مگر كولى شي د بدن په نورو برخو لكه هډوكي، كولې، پښتورگي، او دماغو باندې هم اغيزه ولري .

د پټ نري رنځ انفېكشن او د نري رنځ ناروغي يا توبركلوز ترمنځ څه توپير دي ؟



كله چې BKs سږو ته ننوځي، دوى ډيرى وختونه د بدن دفاعي سيستم په واسطه له مينځه وړل كيږي كه په بدن كې پاتې شي، د BKs ميكروب معمولا "ويده" وي. له همدې امله دوى خطرناك نه دي. په دې مرحله كې، كوم چې د پټ نري رنځ انفېكشن سره مطابقت لري، موږ نه ناروغيه يو او نه موږ ساري يو.

خو كه چېرې د بدن دفاع كافي نه وي (ځكه چې تاسو زاړه ياست، ډير ځوان يا كمزورى ياست)، BK ميكروب كولى شي وينې شي، ډېر شي او د نري رنځ ناروغي رامېنځته كړي.

د نري رنځ يا توبركلوز څنگه تشخيص كيږي؟

د پوستكي لاندې د تيوبركولين پيچكاري دا په ډاگه كولى شي چې ايا تاسو په BK اخته ياست كه نه. كه پرې اخته وي، د پيچكاري د ورځې څخه د ۳ نه تر ۵ ورځو پورې د پيچكاري ځاى كې محلي عكس العمل ښكاره كيږي. دې معايينې ته د تيوبركولين د پوستكي معايينه ويل كيږي (يا پخوا د انټراډرمال عكس العمل يا مانتوكس تيسټ ويل كيږي) او بايد د روغتيا مسلكي كسانو لخوا درته تشرېح شي.

كه د معايينې نتيجه مثبت وي، د سږو ايكس رې بايد واخيستل شي:

- كله چې ايكس رې نورمال راوبښي، دا د يو پټ نري رنځ انفېكشن نښه ده.

- كه نه نو، د سږو د نري رنځ تشخيص لپاره به اضافي معايينات ترسره شي (د بيلگې په توگه: په بلغم كې د BK لټون)

څوك پرې اخته كيډلى شي ؟



د سږو نري رنځ يوه ساري ناروغي ده.

كله چې يو څوك ناروغ وي، د دوى په سږو كې موجود BKs په هوا كې خوشې كيږي نو كله چې دوى توخى كوي، خبرې كوي يا پرنجي وهي، كه موږ دا هوا تنفس كړو، موږ په ورته وخت كې ميكروبوونه تنفس كوو.

په دې وخت كې، لاندې نښې نښانې رابښكاره كيډلى شي كه چېرې د نري رنځ په سږو كې ځاى په ځاى شوى وي:

- توخى
- بلغم (كله ناكله د وينې سره)
- سټريا
- تبه
- د شپې خوله كېدل
- د وزن كموالى

په دې حالت كې، ژر تر ژره د ډاكټر ته ځان ورسوئ !



توخى



بلغم



ستريا



تبه



په خوب كې خوله



د وزن كموالى

له همدې امله هر څوك ممكن په دې ناروغۍ اخته شي. په هرصورت، ځينې خلك د اخته كيډو لوړ خطر لري. دا د ناروغو خلكو سره د پرله پسې او نژدې تماس درلودلو، د ژوند كولو لارو، او د وظيفې ډول پورې اړه لري .