


● Cuál es el tratamiento necesario ?

En la etapa de la infección-tuberculosa

El médico puede ordenar un tratamiento: no es para curar (puesto que la persona no está enferma), sino para disminuir el riesgo de desarrollar una tuberculosis en el futuro. En general, se toma un solo medicamento (antibiótico) todos los días durante 6 o 9 meses.



Si la tuberculosis-enfermedad es confirmada

Es absolutamente necesario seguir un tratamiento prolongado, al menos durante 6 meses. Uno debe tomar varios medicamentos (antibióticos) todos los días. La curación se logra casi en el 100% de casos, si el tratamiento es seguido correctamente.



● Contáctenos

Fonds des Affections Respiratoires asbl

Équipe Centrale

Rue de la Concorde 56 - 1050 Bruxelles
Tél. : 02 512 29 36 - Fax : 02 511 14 17
info@fares.be

Centre de prévention de la tuberculose de Bruxelles

Tél. : 02 511 54 01
cpt.bruxelles@fares.be

Centre de prévention de la tuberculose du Hainaut

Tél. : 071 31 35 04
cpt.hainaut@fares.be

Centre de prévention de la tuberculose de Liège

Tél. : 04 279 30 08
cpt.liege@fares.be

Centre de prévention de la tuberculose du Luxembourg

Tél. : 084 32 06 40
cpt.luxembourg@fares.be

Centre de prévention de la tuberculose de Namur et du Brabant Wallon


Tél. : 081 77 51 02
cpt.namur-brabantwallon@fares.be

Plus d'infos sur
www.fares.be

La tuberculosis...

Esa desconocida


Version espagnole



La tuberculosis... Esa desconocida


● Qué es la tuberculosis ?

La tuberculosis es una enfermedad causada por un **microbio**, el Bacilo de Koch (**BK**). En general, la enfermedad ataca los pulmones, pero puede también afectar otras partes del cuerpo, como los huesos, los intestinos, los riñones, las meninges...



● Quién puede ser contaminado ?

La tuberculosis es una enfermedad **contagiosa**. Cuando una persona está enferma, los BK presentes en sus pulmones son expulsados al aire cuando ella tose, habla o estornuda. Si uno respira este aire, uno respira al mismo tiempo los microbios. Es por eso que cualquiera puede ser **contaminado**.



Ciertas personas presentan sin embargo un **riesgo** más elevado de infección. Esto depende de la posibilidad de tener contactos frecuentes y estrechos con enfermos y, por consiguiente, del modo de vida o el tipo de trabajo.

● "Infección-tuberculosa" y "tuberculosis-enfermedad" : Cuál es la diferencia ?

Cuando los BK llegan a los pulmones, son generalmente eliminados por el sistema de defensa del organismo.

Si quedan en el cuerpo, los BK están generalmente "dormidos" y por consiguiente no son peligrosos.

En esta etapa, que corresponde a la **infección-tuberculosa**, uno no está enfermo y no es contagioso.

Si las defensas del organismo son insuficientes (porque uno está viejo, es muy joven o está débil), los BK pueden despertarse, multiplicarse y provocar una **tuberculosis-enfermedad**.

En ese momento, los siguientes síntomas pueden aparecer, si la tuberculosis se localiza en los pulmones:


- TOS
- EXPECTORACION (a veces con sangre)
- FATIGA
- FIEBRE
- SUDORACION NOCTURNA
- ADELGAZAMIENTO



Es indispensable entonces consultar lo más rápidamente posible a su médico.

● Cómo detectar la infección-tuberculosa ?


Solamente la inyección de **tuberculina** bajo la piel permite saber si uno está infectado por el BK. Si es así, uno constata 3 o 5 días después, la aparición de una reacción local. Esta prueba se llama **reacción-intradérmica**.



Si la prueba es positiva, debe efectuarse una radiografía de pulmones para verificar que la enfermedad no se haya desarrollado.

● Cómo diagnosticar la tuberculosis-enfermedad ?

La radiografía de tórax y la búsqueda de los BK en la expectoración permiten en general establecer si se trata de una tuberculosis pulmonar.



● A quiénes se aplica la prueba ?

- A las personas que están en contacto con un paciente tuberculoso contagioso

En general, se practica una reacción intradérmica para identificar a las personas infectadas.

- A las personas en riesgo

Según el caso, se practica una reacción intradérmica o una radiografía de tórax de manera periódica o más sistemáticamente.