

Pour tout symptôme ou facteur de risque positif, ajoutez le score correspondant. Si vous arrivez à **4 points ou plus** → Référer pour examen complémentaire (au moins RX thorax).

Présence d'un des symptômes clefs		Score	
	Toux chronique (> 3 semaines)	+ 2 p.	
	Hémoptysie (rejet de sang < voies resp.)	+ 4 p.	
Présence d'autres symptômes ?		Score	
	Fièvre modérée (d'origine inconnue)	+ 1 p.	
	Sueurs nocturnes	+ 1 p.	
	Perte de poids et perte d'appétit	+ 1 p.	
	Fatigue prolongée et/ou perte d'énergie	+ 1 p.	
	Douleurs dans la poitrine à la respiration ou pendant la toux	+ 1 p.	
Présence de facteurs de risque?		Score	
	Immunodépression suite à une maladie (VIH...), un traitement etc...	+ 1 p.	
	Antécédents de Tuberculose	+ 1 p.	
TOTAL	Nombre total des points		
Conclusion	Si score total ≥ 4 points → référer pour Rx thorax !		

Cas particulier des jeunes enfants

La checklist n'est pas applicable aux jeunes enfants chez qui il faut être particulièrement attentifs à tout signe de tuberculose **surtout s'il y a eu un contact avec un adulte atteint de TBC contagieuse.**

Symptômes à rechercher chez le jeune enfant	
<ul style="list-style-type: none"> • Fièvre persistante/fébricules répétés (> 10 à 14 jours) ; surtout sans cause évidente • Toux persistante (> 21 jours), sans diagnostic précis, si une autre cause infectieuse est écartée et si le traitement bien conduit n'apporte pas d'amélioration 	<ul style="list-style-type: none"> • Ecoulement de l'oreille • Boiterie • Eruption cutanée • Perte de poids et/ou retard de croissance • Perte d'appétit • Diminution de l'activité



- **Etre attentif à ces symptômes et référer au moindre doute**
- En dehors de la forme pulmonaire, les sites les plus fréquemment touchés sont les suivants : ganglions, plèvre, os (colonne vertébrale), abdomen et méninges.
- Les enfants ne sont qu'exceptionnellement contagieux.