


› КОМУ СЛЕДУЕТ ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ?

- Людям, которые были в **контакте** с пациентом – носителем заразного туберкулеза.
- Людям, **подверженным** риску заболеть туберкулезом в процессе своей профессиональной деятельности.



› КАКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИНИМАТЬ?

В случае латентного (скрытого) туберкулеза:

Врач прописывает профилактическое лечение: оно предназначено для того, чтобы снизить риск развития болезни в будущем и не допустить активацию и размножение микобактерий. Обычно пациент принимает антибиотик каждый день в течении 6 месяцев.

Если туберкулез активный:

Лечение обязательно. Оно длится **не менее 6 месяцев** и включает в себя комбинацию нескольких антибиотиков каждый день. Выздоровление наступает в практически 100% случаях при условии приема препаратов каждый день.




СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Fonds des Affections Respiratoires asbl
Фонд борьбы с респираторными заболеваниями

- › **Центральная команда**
Rue Haute, entrée 290 - 807A
1000 Bruxelles
Tél.: 02 512 29 36 - Fax : 02 511 14 17
prevention.tuberculose@fares.be
- › **Центр профилактики туберкулеза Брюссель**
Tél.: 02 511 54 01
cpt.bruxelles@fares.be
- › **Центр профилактики туберкулеза Hainaut**
Tél.: 071 31 35 04
cpt.hainaut@fares.be
- › **Центр профилактики туберкулеза Liège**
Tél.: 04 279 30 08
cpt.liege@fares.be
- › **Центр профилактики туберкулеза Luxembourg**
Tél.: 084 32 06 40
cpt.luxembourg@fares.be
- › **Центр профилактики туберкулеза Namur и Brabant Wallon**
Tél.: 081 77 51 02
cpt.namur-brabantwallon@fares.be

ЭТОТ НЕЗНАКОМЕЦ ТУБЕРКУЛЕЗ...



Информация
www.fares.be



› ТУБЕРКУЛЕЗ, ЧТО ЭТО?

Туберкулез - это заболевание, вызываемое **микробом** под названием палочка Коха (**БК**). Чаще всего он поражает легкие, но также может поражать другие части тела, такие как кости, кишечник, почки, мозговые оболочки ...


› КТО МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬСЯ ?



Туберкулез легких - заболевание **заразное**. Когда человек болен, палочка коха, присутствующая в в его легких выбрасывается в воздух, когда он кашляет, разговаривает или чихает! Если мы дышим этим воздухом, мы одновременно вдыхаем микробы.

Вот почему любой может **заразиться**. Однако у некоторых людей риск заражения выше. Это зависит от возможности иметь частые и тесные контакты с больными и, следовательно, образ жизни или вид работы.

› ЛАТЕНТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ И ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЕЗНЬ, В ЧЕМ РАЗНИЦА?



Когда ПК (палочки Коха) попадают в легкие, они чаще всего выводятся система защиты тела.

Если они остаются в теле, ПК обычно «спят»; поэтому они не опасны. На этой стадии - латентной туберкулезной инфекции - вы не больны и не заразны.

Если защитные силы организма недостаточны (из-за того, что вы стары, очень молоды или ослаблены), ПК могут проснуться, размножиться и вызвать туберкулез.

В это время могут появиться следующие признаки, если туберкулез локализуется в легких:

- кашель
- мокрота (иногда с кровью)
- усталость
- высокая температура
- ночная потливость
- потеря веса.

В этом случае как можно скорее обратитесь к врачу!



УСТАЛОСТЬ



ВЫСОКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА



НОЧНАЯ
ПОТЛИВОСТЬ



МОКРОТА



КАШЕЛЬ



ПОТЕРЯ ВЕСА

› КАК ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ТУБЕРКУЛЕЗ?

Введение **туберкулина** под кожу помогает узнать, инфицированы ли вы ПК. Если это так, наблюдаем проявление локальной реакции от 3 до 5 дней после инъекции. Этот тест называется **туберкулиновой кожной пробой** (или ранее назывался внутрикожной реакцией или пробой Манту) и должен интерпретироваться медицинским работником.

Если тест положительный, делают рентген легких.

- › Когда рентген в норме, то мы имеем наличие **скрытой туберкулезной инфекции**.
- › В противном случае будут выполнены дополнительные исследования (например, поиск ПК в мокроте) для диагностики **туберкулеза легких**.