

من يقوم بالفحص؟

• الاشخاص الذين كانوا على اتصال بمرضى مصاب بالسل المعدي.

• الاشخاص المعرضون لخطر الإصابة بمرض السل خلال أنشطتهم.



ما هو العلاج؟

إذا كنا في مرحلة الإصابة بالسل الخافي

يمكن لطبيب ان يصف علاج وقائي: ليس للشفاء (لأننا لسنا مرضى) ولكن لتقليل خطر الإصابة بمرض السل في المستقبل. بصفة عامة، نأخذ دواء واحد (مضاد حيوي) كل يوم لمدة 6 أشهر.

إذا تم تأكيد مرض السل

العلاج ضروري. العلاج طويل، 6 أشهر

علا الأقل، وهو عبارة عن أخذ عدت ادويا كثيره (مضاد حيوي) كل يوم. تقريبا 100% من الحالات تتعالج إذا تم اتخاذ الأدوية بطريقة صحيحة.



اتصلوا بنا

Fonds des Affections Respiratoires asbl
جمعية صندوق الالتهابات التنفسية

الفريق المركزي

Rue Haute, entrée 290 - 807A
1000 Bruxelles

Tél.: 02 512 29 36 - Fax : 02 511 14 17
prevention.tuberculose@fares.be

مركز الوقاية من السل بروكسل

Tél.: 02 511 54 01
cpt.bruxelles@fares.be

مركز Hainaut مركز الوقاية من السل في

Tél.: 071 31 35 04
cpt.hainaut@fares.be

مركز Liège مركز الوقاية من السل في

Tél.: 04 279 30 08
cpt.liege@fares.be

مركز Luxembourg مركز الوقاية من السل في

Tél.: 084 32 06 40
cpt.luxembourg@fares.be

مركز Namur et Brabant Wallon مركز الوقاية من السل في

Tél.: 081 77 51 02
cpt.namur-brabantwallon@fares.be

المعلومات
للمزيد من

www.fares.be



◀ ما هو مرض السل؟

مرض السل عبارة عن مرض يسببه ميكروب اسمه المتفطرة السلبيّة أو عصية كوخ. يهاجم غالباً الرئتين ولكن يمكن أن يصل أيضًا إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل العظام والأمعاء والكليتين والسحايا...

◀ من يؤدي به؟


السل الرئوي مرض معد.

عندما يمرض شخص،
العصية كوخ الموجودة
في رئتيه تنتشر في
الهواء من خلال السعال،
الكلام أو العطس! إذا
استنشقتنا هذا الهواء
نستنشق في نفس
الوقت الجراثيم.



لهذا أي شخص يمكنه أن يصاب به.
بعض الأشخاص عندهم احتمال أكبر بالإصابة
بالمرض. هذا مرتبط بالاحتكاك المتواصل
بالمرضى، وبأسلوب الحياة أو نوع العمل.

◀ ما هو الفرق بين الإصابة بالسل الخافي والسل النشط؟



عندما تصل عصية كوخ إلى الرئتين،
غالب يقضى عليها نظام حماية الجسم.

إذا بقيت عصية كوخ في الجسم
تكون بصفة عامة نائمة" لذلك فهي
ليست خطيرة. في هذه المرحلة
التي تعادل الإصابة بالسل الخافي لا
تكون مرضى ولا معديين.

إذا كانت حماية الجسم غير كافية (بسبب
الشيخوخة، صغر السن أو الضعف)، فيمكن لعصية
كوخ ان تستيقظ، وتتضاعف فتسبب مرض السل.

في هذه اللحظة تظهر العلامات التالية إذا كان
السل في الرئتين:

- السعال
- البصق (أحياناً بالدم)
- التعب
- الحمى
- العرق الليلي
- فقدان الوزن

في هذه الحالة يجب أن نذهب في
أسرع وقت ممكن إلى الطبيب.



السعال



البصق



التعب



الحمى



العرق الليلي



فقدن الوزن

◀ كيف يتم فحص السل؟

حقنة التوبركولين تحت الجلد تمكن بمعرفة
الإصابة بعصية كوخ. إذا كان الأمر كذلك
نلاحظ بعد مرور 3 أو 5 أيام ظهور تفاعل
محلي. يسما هذا اختبار السل الجلدي
ويجب ان يترجمه اختصاصي صحي.

إذا كان الاختبار ايجابى، علينا أن نأخذ
صورة لرئتين:

- ◀ إذا كانت الصورة عاديه، أصبنا بالسل الخافي.
- ◀ خلاف ذلك، سيتم اجراء فحوصات إضافية
(تحقق من وجود عصية كوخ في البلغم)
من أجل تشخيص مرض السل الرئوي.